n.° 55.

Nous commissair nomé par l'academie Roial de chirurgie pour examiner un memoire envoyé par M.r Guamlette chirurgien juré Roial, ancien prevot de sa compagnie a Bordeaux, au sujet d'une tumeur située au dessus dela mamelle.

Voicy ceque dit l'auteur que le dix juillet 1746 il fut prié d'aller voir une fille agée d'environ 36 ans, d'un temperament melancolique, tres delicatte et peu secourüe dela nature; elle luy dit que depuis deux ans, il s'etoit formé une tumeur au dessus dela mamelle gauche, qui se portoit du côté de l'aisselle, qui croissoit tous les jours, et lui faisoit beaucoup de douleur par elancemens; quil observa que cette tumeur etoit squirreuse, et dela grosseur de deux oeufs, située sur le grand pectoral, et se portoit dit il jusquá la cavité de l'aiselle, quil annonca ala malade la necessité d'en faire l'extirpation, ala quelle elle ne voulut pas se soumettre, il luy ordonna des remedes generaux et des opiats

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 50 n° 58

fondants quelle continua plus de trois mois accompagné d'un bon regime de vie, malgrez ces secours, la tumeur et la douleur aiant toujours augmenté, elle fut sollicité de se mettre entre les mains d'une empirique qui traittoit ces sortes de maladies avec des scarotiques qui la firent souffrir inutillement. elle fut enfin determinée a se soumettre à l'operation.

le 12 janvier suivant on la fit recevoir a l'hopital ou il fut fait une consultation de plusieurs chirurgiens: le plus grand nombre fut d'avis que l'on devoit traitter palliativement cette tumeur, que l'extirpation étoit dangereuse a cause du voisinage des vaisseaux axillaires, et quelle pouvoit être suivie d'un ulcere chancreux, notre auteur en bon praticien ne fut pas si timide ainsy que Mr Ballay son confrere ils ne furent pas du même avis, et deciderent que l'extirpation étoit possible et necessaire. l'auteur dit quil proposa de faire une incision aux tegumens suivant la longeur de la tumeur, de separer les tegumens, d'enlever les

glandes, de couper le superflu des tegumens, d'absorber le sang de la plaie, ensuitte d'y faire une onction du beaume du Commandeur, de faire des points de suture a la plaie, autant que son étendue l'exigeroit, de couvrir la plaie de plumaceaux trempés dans le dit beaume, et par dessus des compresses trempées dans l'eau de vie, pour evitter dit il les longues et abondanttes supurations, qui sont toujours dangereuses, surtout dans les hopiteaux, ce qui determine souvent les ulceres a devenir chancreux, a cause du mauvais air qui y reigne.

Ce sentiment fut unanimement adopté l'operation fut differée prés d'un mois, et la maladie fit toujours du progrés.

on fit une nouvelle Consultation a l'absence de Mr guamlette qui étoit malade pour lors, il y fut decidé que l'operation n'étoit plus praticable, et quil étoit necessair que la malade fit prendre les Eaux de Barege

nôtre auteur informé de cette decision, se fit amener la malade, fit assembler les consultans, et aprés avoir examiné la maladie,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

il persista pour l'operation qui fut faitte en sa presence par Mr Ballay l'un des consultans, le 20 fevrier suivant.

la tumeur dit l'auteur étoit pour lors composée de huit glandes de differentte grosseur enchainnées les unes avec les autres, dont plusieurs étoient cachées sous l'aiselle.

L'operation faitte, la plaie fut pancée avec le beaume, suivant le premier projet. on fit a la plaie trois points de suture entrecoupée, on laissa une petite issüe a la partie la plus declive de cette plaie, pour laisser un libre cours aux matieres, et empêcher leur sejour.

la malade fut saignée deux fois, une fois le jour de l'operation et le lendemain. quatre jours apres l'operation on arrosa les compresses d'eau de vie.

l'auteur dit que l'on continua a pancer la malade de la même maniere, jusqu'au 12eme jour.

il ne parle point de la levée du premier appareille, il dit seulement que les points de suture se lascherent un peu le 12eme jour, et qu'ils furent coupés le quinzieme

jl ne restoit dit il alors qu'une petite
plaie superficielle, large d'une ligne,
qui fut cicatrisée le 20 mars suivant,
la malade eut tres peu de fievre ala
suitte de l'operation qui se calma
bientot, les elancemens douloureux dont
la malade se pleignoit avant l'operation
cesserent immediatement aprés.

quoique la malade paroisse jouir d'une
bonne santé dit notre auteur, il luy a
fait en bon praticien continuer un regime
de vie convenable, la mise a l'usage
d'un opiat absorbant et aperitif et des
bouillons aperitifs dans la vüe de luy
procurer ses regles, et lui a fait un cautere
ala jambe.

Mr guamlette dit que touttes les glandes
qui composoient la tumeur pesoient
quinze onces et demie que la plus
considerable qui étoit située sur le
grand pectoral étoit ulcerée dans son
milieu que sa surface externe
commencoit a s'interesser, et que c'étoit
a cet endroit ou la malade sentoit des
douleurs et que sans doute ce point
de supuration auroit eu peu de

[library stamp]

temps ouvert les tegumens, et produit un ulcere chanceux.

La façon dont Mr guamlette s'est conduit dans cette cure ingenieuse, est celle d'un bon praticien, le succez en est une preuve convaiquante.

j'estime que son observation meritte d'être mise par extrait dans les memoires de l'academie, ou il sera fait mention des maladies de cette espece, que l'academie doit remercier Mr guamlette de son zelle pour le progrez de l'art, affin de l'engager a luy faire part a l'avenir des faits de pratique circonstanciés, dont elle puisse faire usage.

raporté par nous membre de l'academie Roiale de chirurgie.
A paris ce 24 mars mil sept cent cinquante. —— Delahaye